

## ACESSO DIRETO



**ATENÇÃO:** transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a frase a seguir:

**Lute sempre dando o seu melhor.**

### ANTES DE COMEÇAR A FAZER AS PROVAS:

1. Verifique se este caderno contém um total de 50 (cinquenta) questões, sequencialmente numeradas de 01 a 50.
2. Caso haja algum problema, solicite ao aplicador a substituição deste caderno, imediatamente, após o início da prova.

### AO RECEBER A FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

3. Confira seus dados e, havendo erro, solicite ao aplicador a correção na Ata de Sala.
4. Assine à CANETA nos espaços indicados.

### AO TRANSFERIR AS RESPOSTAS PARA A FOLHA DEFINITIVA (GABARITO):

5. Use somente caneta azul ou preta e aplique traços firmes dentro da área reservada à letra correspondente a cada resposta, conforme modelo:



6. Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa.
7. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

### AO TERMINAR AS PROVAS:

8. Você deve chamar a atenção do aplicador levantando o braço. Ele irá até você para recolher sua FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) e este CADERNO DE PROVAS.
9. Recolha seus objetos, deixe a sala, e em seguida o prédio. A partir do momento em que você sair da sala e até sair do prédio, continuam válidas as proibições sobre o uso de aparelhos eletrônicos e celulares, bem como não lhe é mais permitido o uso dos sanitários.

Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do processo seletivo, o candidato que, durante a sua realização for surpreendido portando (mesmo que desligados) quaisquer aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, relógio de qualquer espécie, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, chaves integradas com dispositivos eletrônicos, controle de alarme de carro e moto, controle de portão eletrônico etc., bem como quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira/grafite, borracha, caneta em material não-transparente, óculos de sol (exceto com comprovação de prescrição médica), qualquer tipo de carteira ou bolsa e armas.

Nome: \_\_\_\_\_

RG: \_\_\_\_\_

**ATENÇÃO:**

Após a prova você poderá levar consigo somente o Gabarito Rascunho.

Duração total destas provas, incluindo o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

**TRÊS HORAS**



**PROVA DE ACESSO DIRETO**

**QUESTÃO 01**

Paciente feminina, 16 anos, apresenta dor abdominal, náuseas, vômitos, fraqueza muscular e sensibilidade à luz. Já apresentou crises semelhantes previamente. Na história familiar, apresenta casos de porfiria aguda intermitente. Qual exame inicial seria adequado para diagnosticar essa doença?

- (A) Dosagem urinária, nas crises, de ácido delta-aminolevulínico (ALA) e de porfobilinogênio (PBG).
- (B) Dosagem de ferritina sérica.
- (C) Biópsia hepática.
- (D) Pesquisa de mutação C282Y.
- (E) Dosagem de bilirrubina sérica.

**QUESTÃO 02**

É fundamental a organização dos serviços em ações básicas de atenção à saúde do idoso na produção do cuidado em defesa da vida. Analise as afirmativas abaixo sobre a saúde do idoso:

- I. As pessoas idosas apresentam maior probabilidade de perder parentes e amigos, de ser mais vulneráveis à solidão, isolamento social e de ter um grupo social diminuído.
- II. Solidão, analfabetismo e falta de educação, maus tratos e exposição a situações de conflito aumentam muito os riscos de deficiências e morte precoce do idoso.
- III. Deve-se dar uma atenção especial aos idosos que moram em áreas rurais, onde os tipos de doenças podem ser diferentes em função das condições do ambiente e da falta de serviço de ajuda disponível.
- IV. Reações adversas e quedas associadas ao uso de medicamentos como tranquilizantes são razões de sofrimento pessoal e internações hospitalares.
- V. Devido a solidão na terceira idade, os idosos tendem a cometer mais suicídios, sendo a maioria realizada por enforcamento.

Indique a alternativa que, de forma **CORRETA**, trata sobre a saúde do idoso.

- (A) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- (B) Apenas as afirmativas II, IV e V estão corretas.
- (C) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.
- (D) Apenas as afirmativas I, II, III e V estão corretas.
- (E) Todas as afirmativas estão corretas.

**QUESTÃO 03**

Paciente do sexo feminino, 49 anos, veio em consulta encaminhada pelo ginecologista pela glicemia alterada (glicemia de jejum 162mg/dl) realizada em “check-up”. Relata que vem aumentando seu peso gradativamente nos últimos 10 anos. Relata ter tido 03 gestações(último filho com 12 anos nasceu com P =4330g). Relata ter sua mãe e tia materna com diabetes. Nega poliúria, polidipsia ou alterações visuais. Relata que não faz atividade física. Come grande quantidade de massas e carne vermelha. Foram realizados os seguintes exames: Glicemia de jejum 149mg/dl, glicemia pós-prandial 188 mg/dl e HbA1c7,2%. Qual a conduta que pode ser realizada para esta paciente?

- (A) Mudanças do estilo de vida (controle alimentar, atividade física regular) para perda de peso.
- (B) Mudanças do estilo de vida + metformina.
- (C) Mudanças do estilo de vida +inibidores do SGLT2.
- (D) Mudanças do estilo de vida + metformina ou inibidores do SGLT2 ou análogo do GLP1 ou inibidor da DPPIV ou pioglitazona.
- (E) Mudanças do estilo de vida + insulina.

**QUESTÃO 04**

Paciente Feminino, 20 anos, branca, Casada, Brasileira, Naturalidade: Araguatins – TO. Procedência: Dianópolis – TO. Com queixa principal de “Cólica abdominal”. A paciente queixa-se de dor abdominal em cólica abdominal, com história clínica de episódios de diarreia, febre e dor abdominal com períodos assintomáticos de semanas a meses. Realizada a biópsia, os cortes histológicos do íleo terminal de um paciente demonstram inflamação transmural, granulomas não caseosos e fistulas.

Qual o provável diagnóstico?

- (A) Tuberculose.
- (B) Amebíase.
- (C) Doença de Crohn.
- (D) Doença de Whipple.
- (E) Leite parasitária.

**QUESTÃO 05**

Ao exame físico abdominal, auscultaram-se ruídos metálicos. Isto significa que o paciente tem:

- (A) aumento da peristalse intestinal por uma diarreia.
- (B) diminuição da peristalse por apendicite.
- (C) sinais de irritação peritonial.
- (D) obstrução intestinal.
- (E) diminuição da peristalse intestinal por uma diarreia.

**QUESTÃO 06**

Os aspectos clínicos importantes para o diagnóstico diferencial das inflamações conjuntivais são: sintomas, secreção, reação conjuntival, membranas, ceratopatia associada e linfadenopatia. Das infecções conjuntivais apresentadas, qual não apresenta linfadenopatia?

- (A) Infecções por vírus.
- (B) Infecções por *Chlamydia*.
- (C) Infecção por gonococos.
- (D) Síndrome oculoglandular de Parinaud.
- (E) Infeção por *H. influenzae*.

**QUESTÃO 07**

A colonoscopia é um importante procedimento médico na investigação de diversas doenças intestinais, mais notadamente do intestino grosso, entre elas a Colite Ulcerativa. Observe as respostas a seguir e escolha a mais adequada no contexto da colonoscopia na colite ulcerativa.

- (A) A colonoscopia não é recomendada em pacientes com doença grave ativa para não se correr o risco de distensão abdominal perforativa.
- (B) A colonoscopia é recomendada em pacientes com doença grave ativa, pois neste estágio nenhuma complicação irá ocorrer.
- (C) A colonoscopia é perfeitamente recomendada em pacientes com doença grave ativa, tendo em vista que examina com exatidão toda a extensão do intestino delgado.
- (D) Depois de a doença ativa ter sido controlada em um paciente com colite ulcerativa recém-diagnosticada, a colonoscopia deve ser realizada para estabelecer a extensão da doença e excluir por exemplo doença de Crohn.
- (E) Depois de a doença ativa ter sido controlada em um paciente com colite ulcerativa recém-diagnosticada, a colonoscopia deve ser realizada para estabelecer a extensão da doença, mas não é possível através do procedimento excluir a doença de Crohn. Por outro lado, é possível estabelecer o diagnóstico das duodenites através da colonoscopia.

**QUESTÃO 08**

Paciente masculino, de 62 anos de idade, procura o médico, amedrontado porque seu pai e seu irmão tiveram o diagnóstico de câncer de intestino grosso. Seu pai teve o diagnóstico aos 67 anos e veio a morrer pela doença após 2 anos. Seu irmão caçula está em tratamento atual, aos 54 anos. Ele questiona se deveria fazer algum exame de prevenção. No momento assintomático. Informa ser pai de dois filhos com boa saúde.

Qual a melhor conduta?

- (A) Indicar colonoscopia para o paciente agora .
- (B) Indicar colonoscopia para ele agora e, para os filhos a partir dos 40 anos de idade.
- (C) Indicar acompanhamento de todos com pesquisa de sangue oculto nas fezes.
- (D) Acalmar o paciente e esclarecer que aguarde um sintoma ou sinal para colonoscopia dos filhos.
- (E) Indicar colonoscopia para todos eles imediatamente

**QUESTÃO 09**

A fibrilação atrial é uma arritmia que tem o potencial de favorecer a formação de trombo intracavitário no átrio esquerdo, mais especificamente, no apêndice atrial esquerdo, o que aumenta o risco de eventos embólicos.

Em um paciente clinicamente estável, com fibrilação atrial, qual é o tempo máximo na presença de tal arritmia, no qual pode-se realizar a cardioversão, química ou elétrica, sem a necessidade de período de anticoagulação prévia ou mesmo da pesquisa de trombas intracavitários pelo ecocardiograma transesofágico?

- (A) 12 horas.
- (B) 24 horas.
- (C) 36 horas.
- (D) 48 horas.
- (E) 72 horas.

**QUESTÃO 10**

A retinopatia diabética é a alteração ocular mais comum no paciente diabético tipo 1 e tipo 2.

Qual o fator de risco mais importante da retinopatia diabética?

- (A) Duração da diabetes.
- (B) Gravidez.
- (C) Controle metabólico inadequado.
- (D) Dislipidemia.
- (E) Idade.

**QUESTÃO 11**

Apendicite aguda é a causa mais comum de abdome agudo inflamatório. Com relação a essa patologia, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) Uma das indicações de incisão mediana infraumbilical é a presença de dor localizada em fossa ilíaca direita, sem sinais de irritação peritoneal difusa
- (B) A via laparoscópica apresenta maiores taxas de infecção de ferida operatória e retorno mais tardio ao trabalho
- (C) A característica clínica mais confiável no diagnóstico de apendicite aguda é a dor periumbilical com posterior migração para fossa ilíaca direita
- (D) O diagnóstico deve ser sempre confirmado com exames de imagem
- (E) Na radiografia de tórax, é comum o achado de pneumoperitônio

**QUESTÃO 12**

Paciente masculino, 30 anos, com queixa de dor abdominal do tipo cólica há 3 dias, com piora progressiva associado a parada de eliminação de flatos e fez-se há 2 dias. Refere vários episódios de vômitos de odor fétido e distensão abdominal. Nega comorbidades, tabagismo e etilismo. Refere ter sido submetido a apendicectomia há 3 anos. Ao exame: abdome distendido, hipertímpanico , doloroso a palpação abdominal difusa, sem sinais de irritação peritoneal difusa.

Com relação ao caso clínico pode-se afirmar:

- (A) Trata-se de abdome agudo obstrutivo e a principal etiologia é fecaloma
- (B) Trata-se de abdome agudo perfurativo e a principal etiologia é úlcera péptica perfurada
- (C) Trata-se de abdome agudo inflamatório e a principal etiologia é apendicite aguda
- (D) Trata-se de abdome agudo isquêmico e a principal etiologia é embolia mesenterica
- (E) Trata-se de abdome agudo obstrutivo e a principal etiologia é brida

**QUESTÃO 13**

Pancreatite aguda (PA) é a inflamação aguda do pâncreas caracterizada pelo início súbito dos sintomas em um indivíduo previamente saudável e o desaparecimento deste sintoma quando o episódio cessa.

Acerca dessa patologia, assinale a alternativa correta:

- (A) A grande maioria das pancreatites agudas são classificadas como leve e são tratadas com jejum e hidratação
- (B) A principal causa de PA é a medicamentosa
- (C) Níveis elevados de amilase estão relacionados com pior prognóstico
- (D) Se a causa da PA for colelitíase, após a resolução do quadro de PA, a colecistectomia deve ser realizada após 3 meses
- (E) A dor abdominal em barra está presente em quase 100% dos casos

**QUESTÃO 14**

Paciente feminina, 40 anos, obesa com quadro de dor em hipocôndrio direito (HCD) há 3 meses, do tipo cólica, associado a vômitos e desencadeado por alimentos gordurosos. Procurou atendimento na unidade básica de saúde onde foi solicitado uma ultrassonografia que evidenciou cálculos em vesícula biliar.

Com relação ao caso clínico, pode-se afirmar que:

- (A) Uma das complicações da patologia é o câncer de cabeça de pâncreas
- (B) Se a paciente evoluir com dor abdominal, febre com calafrios e icterícia, uma das hipóteses diagnóstica é a colangite aguda
- (C) A via cirúrgica de escolha é pela incisão de Kocher, pois é a que leva a menos dor no pos operatório quando comparada a videolaparoscopia
- (D) Se durante o exame físico da paciente for evidenciado Sinal de Murphy positivo, sugere pancreatite aguda
- (E) Durante o procedimento cirúrgico, deve-se ligar a artéria cística, ducto colédoco e o ducto cístico

**QUESTÃO 15**

As doenças proctológicas são muito comuns na prática clínica.

Com relação a essas doenças, pode-se afirmar que:

- (A) A doença hemorroidária interna caracteriza-se por sangramento anal vivo as evacuações extremamente dolorosas.
- (B) A localização mais comum das fissuras anais são na região lateral do canal anal.
- (C) O abscesso perianal se caracteriza por dor intensa em região perianal, do tipo pulsátil, constante, associado a abaulamento local.
- (D) A fistula perianal é uma comunicação entre o canal anal e a pele perianal, preenchida por tecido de granulação e tem como causa mais comum a doença de Crohn.
- (E) A trombose hemorroidária externa caracteriza-se como uma nodulação perianal constante, sangramento anal, porém não apresenta dor.

**QUESTÃO 16**

A respeito do câncer colorretal, marque a alternativa **CORRETA**:

- (A) Noventa por cento dos casos de câncer colorretal apresentam história familiar positiva.
- (B) O principal tipo histológico é o carcinoma epidermoide.
- (C) A principal localização desses tumores é o cólon transversal.
- (D) O CEA, é o principal marcador tumoral e pode ser usado no rastreamento do câncer colorretal.
- (E) Pode-se apresentar clinicamente como anemia, dor abdominal de início recente, sangramento anal e alteração do hábito intestinal.

**QUESTÃO 17**

Com relação aos divertículos colônicos, assinale a alternativa correta:

- (A) São divertículos verdadeiros, e a localização mais comum é no colon sigmoide
- (B) As duas principais complicações dos divertículos são a diverticulite e a obstrução intestinal
- (C) A localização mais comum da diverticulite aguda é no colon ascendente
- (D) Quando ocorre sangramento intestinal baixo, geralmente os divertículos que estão sangrando se encontram no lado direito do colon
- (E) O exame de imagem padrão ouro na avaliação da diverticulite aguda é a ultrassonografia de abdome

**QUESTÃO 18**

A respeito das hérnias de parede abdominal pode-se afirmar que:

- (A) As hérnias mais comuns são as hérnias femorais, sendo mais comum do lado direito
- (B) As hérnias inguinais diretas se originam do não fechamento do conduto peritônio vaginal
- (C) O conteúdo do canal inguinal na mulher é o ligamento redondo do útero
- (D) As hérnias inguinais podem complicar com encarceramento e estrangulamento, sendo que o encarceramento apresenta pior prognóstico
- (E) A técnica que apresenta menores taxas de recidiva na correção de hérnias inguinais é a técnica de Bassini

**QUESTÃO 19**

Acerca da hemorragia digestiva baixa, assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) É definida como todo sangramento originado acima do ângulo de Treitz
- (B) As duas principais causas relacionadas com o colon, em casos de hemorragia maciça em idoso são doença diverticular dos colons e câncer colorretal
- (C) A primeira conduta em paciente instável hemodinamicamente deve ser a realização de colonoscopia
- (D) Os métodos de imagem que podem ser utilizadas para definição da etiologia são: ultrassonografia de abdome, colonoscopia e arteriografia
- (E) A grande maioria dos sangramentos cessam espontaneamente

**QUESTÃO 20**

Com relação ao câncer gástrico, pode-se afirmar que:

- (A) O tipo histológico mais comum é o Adenocarcinoma e a localização mais comum é no fundo gástrico
- (B) Pode-se apresentar com dor epigástrica, anemia e perda de peso
- (C) O principal local de metástase é o cérebro
- (D) A presença de linfonodo supraclavicular esquerdo não é indicativo de metástase à distância
- (E) O melhor exame para definição diagnóstica na suspeita de câncer gástrico é a tomografia de abdome superior

**QUESTÃO 21**

Qual destes Sinais ou sintomas **NÃO** é considerado sinal de gravidade de pneumonias em crianças:

- (A) Febre
- (B) Tiragem subcostal
- (C) Gemência
- (D) Batimentos de asa de nariz
- (E) Saturação de O<sub>2</sub> menor que 92 %

**QUESTÃO 22**

Em crianças entre zero a 1 mês de vida qual das bactérias a seguir **NÃO** faz parte dos agentes etiológicos mais comuns causadores de meningite bacteriana ?

- (A) *Listeria monocytogenes*
- (B) *Streptococcus agalactiae*
- (C) *Neisseria meningitidis*
- (D) *Escherichia coli*
- (E) *Klebsiella Sp*

**QUESTÃO 23**

Em crianças na idade pré escolar o agente etiológico mais frequente de epiglottite aguda é:

- (A) *Klebsiella pneumoniae*
- (B) *Staphylococcus aureus*
- (C) *Haemophilus influenzae*
- (D) *Streptococcus pneumoniae*
- (E) *Streptococcus Beta hemolítico do grupo A de lancefield*

**QUESTÃO 24**

No sexo masculino, a frequência de Infecção do Trato Urinário (ITU) é maior :

- (A) Na fase pré escolar
- (B) Na fase escolar
- (C) Nos primeiros 3 meses de vida
- (D) Na adolescência
- (E) Até a retirada da fralda

**QUESTÃO 25**

Qual das doenças exantemáticas abaixo é causada por bactérias?

- (A) Varicela
- (B) Roséola
- (C) Sarampo
- (D) Escarlatina
- (E) Doença de Kawasaki

**QUESTÃO 26**

Pré escolar, 4 anos de idade, apresenta após picada de abelha, rash cutâneo intenso, taquicardia e dificuldades respiratórias. A medicação de 1º linha é:

- (A) Corticoesteróides endovenoso
- (B) Corticoesteróides oral
- (C) Epinefrina
- (D) Anti histamínicos
- (E) B2 agonistas

**QUESTÃO 27**

Qual tipo de malformação fetal associa-se a Polidrâniomaterno?

- (A) Atresia de esôfago
- (B) Atresia de duodeno
- (C) Atresia de intestino delgado proximal
- (D) Pâncreas anular
- (E) Todas as alternativas acima

**QUESTÃO 28**

Qual das verminoses caracteriza-se por alta prevalência em comunidades fechadas como orfanatos e creches?

- (A) Enterobíase
- (B) Estrongiloidíase
- (C) Amebíase
- (D) Ancilostomíase
- (E) Giardiase

**QUESTÃO 29**

Em uma criança com os seguintes achados: Presença de fontanela Bregmática ampla, Hipofosfatemia, elevação dos níveis de fosfatase alcalina e alargamento das epífises ósseas. Deve-se pensar no seguinte diagnóstico?

- (A) Escorbuto
- (B) Bériberi
- (C) Raquitismo carencial
- (D) Hipovitaminose E
- (E) Hipervitaminose A

**QUESTÃO 30**

Qual das seguintes vacinas é contraindicada durante a Gravidez?

- (A) Varicela
- (B) Hepatite B
- (C) Influenzae
- (D) Toxóide tetânico
- (E) DTP

**QUESTÃO 31**

A definição de Menacme é:

- (A) A primeira menstruação de uma mulher
- (B) Período da vida da mulher entre a primeira e a última menstruação natural
- (C) Última menstruação natural da mulher
- (D) Lesão vulvar inespecífica
- (E) Lesão condilomatosa na vulva por HPV

**QUESTÃO 32**

Em relação à miomatose (leiomiomas), assinale a alternativa **CORRETA**:

- (A) São assintomáticos em menos de 10% dos casos
- (B) São comumente detectados entre os 60 e 80 anos de idade
- (C) São os tumores pélvicos sólidos mais freqüentes nas mulheres em idade fértil
- (D) O tratamento de escolha, independentemente dos sintomas é a histerectomia
- (E) A ultrassonografia endovaginal não tem valor diagnóstico

**QUESTÃO 33**

Em pacientes com Diagnóstico de Gestação Ectópica íntegra, hemodinamicamente estáveis, é passível o tratamento clínico. A medicação que possui efeito inibidor da multiplicação trofoblástica é:

- (A) Nifedipina
- (B) Progesterona Natural (Utrogestan®)
- (C) Atosibano
- (D) Indometacina
- (E) Metotrexato

**QUESTÃO 34**

Das drogas abaixo, assinale a de primeira escolha na Vaginose Bacteriana durante a gestação:

- (A) Metronidazol
- (B) Fluconazol
- (C) Itraconazol
- (D) Fenticonazol
- (E) Butoconazol

**QUESTÃO 35**

A SOP (Síndrome dos Ovários Policísticos), é um Defeito Primário NeuroEndócrino. Assinale a assertiva **CORRETA**:

- (A) Não tem qualquer relação com o aumento da oleosidade da pele
- (B) Está associada a ciclos menstruais regulares
- (C) Está associada a ciclos menstruais curtos (paciente fica menstruada a cada 15 dias)
- (D) Esta fortemente associada à metrorragia abundante e volumosa
- (E) Está associada à Diabetes gestacional

**QUESTÃO 36**

Das indicações abaixo, qual a principal justificativa para o uso da Tibolona?

- (A) Terapia hormonal em pacientes no Climatério
- (B) Tratamento de Lesões precursoras do Câncer de colo Uterino
- (C) Tratamento do Câncer de mamas
- (D) Tratamento da Vaginose Bacteriana
- (E) Tratamento da Mastite Puerperal

**QUESTÃO 37**

Dos citados abaixo, qual o agente etiológico mais comum na Mastite Puerperal?

- (A) *Mycoplasma*
- (B) *Staphylococcus aureus*
- (C) *Staphylococcus epidermidis*
- (D) *Mobiluncus*
- (E) *Clamídia*

**QUESTÃO 38**

Diante de uma quadro de atonia uterina **NÃO** está indicado o uso de(a):

- (A) Manobra de Amilton
- (B) Progesterona Natural (Utrogestan®)
- (C) Ocitocina
- (D) Misoprostol
- (E) Pontos de B-Lynch

**QUESTÃO 39**


Quando o blastocisto se implanta no endométrio, o sincitiotrofoblasto produz \_\_\_\_\_, hormônio que estimula o corpo Lúteo a produzir \_\_\_\_\_, hormônio fundamental na manutenção da gravidez.

Qual das palavras abaixo melhor preenche as lacunas acima respectivamente?

- (A) FSH (Hormônio Folículo Estimulante) e Testosterona
- (B) hCG (Gonadotrofina Coriônica Humana) e LH (Hormônio Luteinizante)
- (C) hCG (Gonadotrofina Coriônica Humana) e Progesterona
- (D) LH (Hormônio Luteinizante) e hCG (Gonadotrofina Coriônica Humana)
- (E) Estrogênio e Progesterona

**QUESTÃO 40**

A imagem abaixo apresenta:



- (A) Útero Bicorno
- (B) Útero Septado
- (C) Útero Didelfo
- (D) Útero Arqueado
- (E) Útero Unicorno

**QUESTÃO 41**

Dos princípios do SUS abaixo aquele que possibilita o atendimento prioritário a um paciente idoso em detrimento de um adulto jovem é:

- (A) Universalidade
- (B) Equidade
- (C) Integralidade
- (D) Hierarquia
- (E) Nenhum anterior

**QUESTÃO 42**

Uma paciente assintomática comparece a Unidade Básica e realiza a coleta de exame de secreção vaginal a fresco. Observa-se no próprio microscópio da unidade a presença de “células-alvo”. Com base neste achado o diagnóstico mais adequado é:

- (A) Trimoníase
- (B) Candidíase
- (C) Gonorreia
- (D) Vaginose bacteriana
- (E) Oxiúriase

**QUESTÃO 43**

Quanto as alternativas a seguir:

- I. O *Mycobacterium leprae* tem baixa infectividade e alta patogenicidade.
- II. A via aérea superior é a principal fonte de eliminação do bacilo para o meio ambiente, a partir de pessoa doente sem tratamento.
- III. A transmissão da hanseníase se faz por contato direto com a pele de pessoas doentes.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) Apenas a afirmativa I está correta.
- (B) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (C) Apenas a afirmativa II está correta.
- (D) Apenas as afirmativas II e III estão corretas.
- (E) Todas as afirmativas estão corretas.

**QUESTÃO 44**

Com relação aos aspectos clínico-epidemiológicos da Dengue assinale a alternativa **INCORRETA**.

- (A) A epidemia é controlada através do combate ao vetor.
- (B) A gripe e a rubéola podem fazer diagnóstico diferencial com a dengue clássica.
- (C) Febre alta por 15 dias persiste na dengue clássica.
- (D) A transmissão do vírus se faz pela picada da fêmea do *Aedes aegypti*.
- (E) Sarampo também pode fazer diagnóstico diferencial com dengue clássica.

**QUESTÃO 45**

Paciente idoso, 62 anos, chega a UBS com relato de febre há 3 dias associada a disúria e polaciúria. Ao exame físico apresenta-se febril e próstata de volume aumentada e dolorosa ao toque retal. O diagnóstico mais provável para o caso é:

- (A) Prostatite aguda
- (B) Orquite
- (C) Epididimite
- (D) Hipertrofia prostática benigna
- (E) Uretrite

**QUESTÃO 46**

Dentre as alternativas abaixo apresentam recomendações na abordagem da criança exposta ao HIV materno **EXCETO**:

- (A) Indicação de parto cirúrgico eletivo
- (B) Uso de zidovudina ao recém-nascido
- (C) Puericultura a cada 15 dias nos dois primeiros meses.
- (D) Aleitamento materno
- (E) Nenhuma das anteriores

**QUESTÃO 47**

Com relação às terapias medicamentosas para a cessação do hábito de fumar, analise as afirmativas a seguir.

- I. Epilepsia é uma contra indicação ao uso da bupropiona.
- II. A combinação de dois métodos nicotínicos como adesivo mais goma de mascar de nicotina é contraindicado devido risco de intoxicação.
- III. Bupropiona, adesivos de nicotina e goma de mascar são os únicos métodos aprovados para o tratamento do tabagismo.

Marque a alternativa **CORRETA**.

- (A) Apenas a afirmativa I está correta.
- (B) Apenas a afirmativa II está correta.
- (C) Apenas a afirmativa III está correta.
- (D) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- (E) Todas as afirmativas estão corretas

**QUESTÃO 48**

Paciente com 44 anos comparece à UBS já em tratamento para hipertensão estágio 2, em uso de diurético tiazídico e betabloqueador como terapia inicial. São riscos importantes neste paciente:

- (A) Hipercalemia e hiperuricemia
- (B) Hipocalemia e tosse
- (C) Hipovolemia e tosse
- (D) Hipocalemia e broncoespasmo
- (E) Hipovolemia e hiperuricemia

**QUESTÃO 49**

São os 4 elementos estruturais da Atenção Primária à Saúde:

- (A) gratuidade, descentralização, municipalização e equidade.
- (B) acesso de primeiro contato, integralidade, longitudinalidade e coordenação do cuidado.
- (C) humanização, equidade, integralidade e universalidade.
- (D) universalidade, longitudinalidade, equidade e humanização
- (E) gratuidade, humanização, integralidade e universalidade.

**QUESTÃO 50**

Dentre os exames abaixo, aqueles solicitados obrigatoriamente na primeira consulta de pré-natal são, **EXCETO**:

- (A) Hemoglobina
- (B) Uréia
- (C) VDRL
- (D) Anti-HIV
- (E) Glicemia de jejum