

ACESSO DIRETO

PROGRAMAS: INFECTOLOGIA, MEDICINA DE FAMÍLIA E COMUNIDADE e PEDIATRIA.



ATENÇÃO: transcreva no espaço apropriado da sua FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO), com sua caligrafia usual, considerando as letras maiúsculas e minúsculas, a seguinte frase:

Uma meta sem um plano é somente um desejo.

ANTES DE COMEÇAR A FAZER AS PROVAS:


1. Verifique se este caderno contém um total de 50 (cinquenta) questões, sequencialmente numeradas de 01 a 50.
2. Caso haja algum problema de impressão ou divergência, solicite ao aplicador a substituição deste caderno, impreterivelmente, até 15 minutos após o início da prova.

AO RECEBER A FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

3. Confira seus dados e, havendo erro, solicite ao aplicador a correção na Ata de Sala.
4. Assine à CANETA nos espaços indicados.

AO TRANSFERIR AS RESPOSTAS PARA A FOLHA DEFINITIVA (GABARITO):

5. Use somente caneta azul ou preta e aplique traços firmes dentro da área reservada à letra correspondente a cada resposta, conforme modelo:



6. Sua resposta NÃO será computada se houver marcação de mais de uma alternativa.
7. A folha de respostas não deve ser dobrada, amassada ou rasurada.

AO TERMINAR AS PROVAS:

8. Você deve chamar a atenção do aplicador levantando o braço. Ele irá até você para recolher sua FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO) e este CADERNO DE PROVAS.
9. Recolha seus objetos, deixe a sala, e em seguida o prédio. A partir do momento em que você sair da sala e até sair do prédio, continuam válidas as proibições sobre o uso de aparelhos eletrônicos e celulares, bem como não lhe é mais permitido o uso dos sanitários.

Terá suas provas anuladas e será automaticamente eliminado do processo seletivo, o candidato que, durante a sua realização for surpreendido portando (mesmo que desligado) quaisquer aparelhos eletrônicos, tais como bip, telefone celular, relógio de qualquer espécie, walkman, agenda eletrônica, notebook, palmtop, ipod, ipad, tablet, pen drive, receptor, gravador, máquina de calcular, máquina fotográfica, chaves integradas com dispositivos eletrônicos, controle de alarme de carro e moto, controle de portão eletrônico etc., bem como quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc., e ainda lápis, lapiseira/grafite, borracha, caneta em material não-transparente, óculos de sol (exceto com comprovação de prescrição médica), qualquer tipo de carteira ou bolsa e armas

Nome: _____
RG: _____

ATENÇÃO:

Após a prova você poderá levar consigo somente o Gabarito Rascunho.

Duração total destas provas, incluindo o preenchimento da FOLHA DE RESPOSTAS (GABARITO):

QUATRO HORAS

PROVA ACESSO DIRETO**QUESTÃO 01**

Um paciente de 50 anos de idade apresenta história de insuficiência cardíaca de longa data. Foi ao ambulatório com NYHAA I, em uso de enalapril 10 mg BID, espirolactona 25 mg, bisoprolol 10 mg e furosemida 40 mg 2 x ao dia. A pressão do paciente era de 130 mmHg x 80 mmHg. Houve piora funcional do paciente para classe III. O médico resolveu prescrever sacubitril associado à valsartana no lugar de enalapril.


Com relação ao caso clínico apresentado, o paciente retorna após duas semanas, com melhora importante da classe funcional.

Assinale a alternativa que apresenta o resultado esperado pelo médico para o exame laboratorial realizado pelo paciente.

- (A) Aumento do BNP.
- (B) Melhora da ureia.
- (C) Melhora da creatinina.
- (D) Aumento da aldosterona.
- (E) Aumento do cálcio total.

QUESTÃO 02

Um paciente de 55 anos de idade chega ao pronto-socorro com dor torácica há três horas, dispnéia e sensação de sufocamento. Ao exame físico, apresentava-se em Killip III. Foi solicitado eletrocardiograma, demonstrado na imagem.



Acerca desse caso clínico e do eletrocardiograma, é CORRETO afirmar que a principal artéria acometida e o ritmo principal são:

- (A) Artéria circunflexa e ritmo atrial ectópico.
- (B) Artéria coronária direita ritmo atrial.
- (C) Artéria coronária direita ritmo atrial baixo.
- (D) Artéria coronária direita ritmo sinusal.
- (E) Artéria coronária direita ritmo atrial migratório.


QUESTÃO 03

Uma jovem com diagnóstico de BAVT congênito. Com relação ao quadro qual teria indicação de marcapasso definitivo.

- (A) BAVT congênito assintomático.
- (B) BAVT congênito com QRS largo assintomático.
- (C) BAVT congênito atingindo a FC submáxima no teste.
- (D) Todo paciente com BAVT congênito tem indicação de marcapasso definitivo.
- (E) Paciente que não atingiu a FC submáxima no teste ergométrico.

QUESTÃO 04

Paciente de 80 anos, sexo feminino diabética e hipertensa, que faz uso de carvedilol 12.5mg- 01 comprimido duas vezes, furosemida 40 mg- 01 comprimido ao dia. A paciente é levada a unidade básica de saúde pela neta devido a episódios de síncope e dispnéia aos esforços que apresentou piora nos últimos dias. Durante o exame físico é observado um ritmo cardíaco irregular, na ausculta cardíaca um sopro sistólico ++/4 em foco mitral com irradiação para dorso. No exame do aparelho respiratório é observado estertores crepitantes bibasais em terço inferior. A paciente traz consigo um ECG realizado uma semana atrás o primeiro e o segundo realizado durante a consulta na UBS.



O que ocorreu de alteração no eletrocardiograma da paciente?

- (A) Nada ocorreu no eletrocardiograma.
- (B) Houve mudança do ritmo de sinusal para fibrilação atrial.
- (C) Houve mudança do ritmo de sinusal para flutter atrial.
- (D) Houve mudança do ritmo de sinusal para taquicardia atrial.
- (E) Houve mudança do ritmo de sinusal para fibrilação atrial de alta resposta.

QUESTÃO 05

Sobre o caso clínico da QUESTÃO anterior (Q.04):

Qual é a explicação fisiopatológica para o quadro de dispnéia da paciente?

- (A) A mudança do ritmo sinusal.
- (B) Só teve dispnéia aos esforços, comum em uma idosa de 80 anos.
- (C) Perda de 25-30% do débito cardíaco.
- (D) Não houve mudança do ritmo.
- (E) Houve dispnéia pela frequência cardíaca alterada.

QUESTÃO 06

Paciente masculino, procedente de Novo Repartimento, 72 anos. Refere febre há 3 dias, com temperatura máxima de 38°C, associada a vômitos, 4 episódios ao dia. Trouxe exame de malária com *P. vivax*= ++. Refere que é o segundo episódio, o primeiro foi há 8 meses. Bom volume urinário. Nega sangramentos. PA=120X70 mmHg. Ao exame: consciente, orientado, eupneico, febril (37,8°C), hipocorado (+/4+), sem petéquias, anictérico e acianótico. Restante do exame normal.

Com relação ao caso acima, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Idade acima de 70 anos e vômitos repetidos.
- (B) Não tem indicação de internação.
- (C) Idade e ter tido outro episódio prévio de malária.
- (D) Está hipocorado.
- (E) Por ser *P. vivax* tem indicação de internação.


QUESTÃO 07

Este quadro mostra como a espessura de Breslow é a variável mais importante para o prognóstico do melanoma. Com relação a espessura do tumor, podemos afirmar:

PROGNOSTIC VARIABLES

- The Breslow thickness is the single most important prognostic variable (distance in mm of the furthest tumour cell from the basal layer of the epidermis)

Breslow depth	5 year survival
In situ	95-100%
<1mm	95-100%
1-2mm	80-96%
2.1-4mm	60-75%
>4mm	50%



- (A) Quanto maior a espessura maior chance de metástase.
- (B) A espessura não tem relação com a sobrevida.
- (C) A espessura maior facilita o tratamento e não prejudica a sobrevida.
- (D) Todos melanomas não precisam avaliar espessura.
- (E) A espessura melhora a sobrevida.

QUESTÃO 08

Paciente masculino, 37 anos, da zona rural foi acometido a noite por algum animal em pé esquerdo e chega no pronto socorro com parestesias e turvação visual.

De qual animal você suspeitaria?

- (A) Acidente Escorpiónico
- (B) Acidente ofídico por botrópico
- (C) Acidente ofídico por lachesis
- (D) Acidente ofídico por crotálico
- (E) Acidente por largata

QUESTÃO 09

Paciente morador de Tocantinópolis com febre obscura, emagrecimento, inapetência e hepatoesplenomegalia sendo diagnosticado com leishmaniose visceral. Quais achados mais frequentes nos exames laboratoriais?

- (A) Anemia e hipoalbuminemia
- (B) Plaquetopenia e inversão da relação da albumina globulina
- (C) Pancitopenia e inversão da relação da albumina globulina
- (D) Pancitopenia e hipoalbuminemia
- (E) Hipolalbuminemia e hipoglobulinemia

QUESTÃO 10

Criança de 3 anos foi mordida na orelha pelo cão da família. Qual a conduta?

- (A) Observar o cão por 10 dias e vacinar a criança duas doses
- (B) Apenas observar o cão
- (C) Observar o cão por 10 dias e tomar imunoglobulina
- (D) Observar o cão por 10 dias e vacinar a criança quatro doses
- (E) Tomar vacina e imunoglobulina

QUESTÃO 11

Em relação às técnicas operatórias para correção de hérnias inguinais e femorais, assinale a alternativa que contém a técnica cirúrgica utilizada tanto para hérnias femorais e inguinais e que dispensa a utilização de telas.

- (A) Lichtenstein
- (B) Shouldice
- (C) Bassini
- (D) Mcvay
- (E) Stopa

QUESTÃO 12

São componentes do cordão espermático as seguintes estruturas, EXCETO:

- (A) Ducto deferente
- (B) Artéria testicular
- (C) Ramo genital do nervo genitofemoral
- (D) Plexo pampiniforme
- (E) Nervos pudendo externo

QUESTÃO 13

Sobre a tuberculose genitourinária, assinale a assertiva INCORRETA:

- (A) A forma mais comum de disseminação é a hematogênica, sendo o rim o órgão mais comumente acometido
- (B) A tuberculose genital pode envolver todo o trato genital masculino, incluindo próstata, epidídimo, testículo, glândulas de Cooper, deferente, vesícula seminal e penis
- (C) O epidídimo raramente é acometido e sua fistulização é ainda mais incomum
- (D) As manifestações iniciais da TB do trato urinário são insidiosas e inespecíficas como piúria ou hematúria
- (E) O diagnóstico deve ser sempre pensado em pacientes com história de TB pulmonar e que apresentam exames de urina com Piúria sem o crescimento de bactérias à urocultura

QUESTÃO 14

Paciente de 23 anos, previamente hígido, procura atendimento no posto de saúde com queixa de disúria e secreção uretral purulenta, após relação sexual sem preservativo há 4 dias. No posto em questão não se tem disponibilidade de exames laboratoriais ou a fresco. Com relação ao quadro exposto acima, assinale a alternativa que contém o melhor tratamento empírico para o paciente:

- (A) Ciprofloxacino 500mg via oral dose única
- (B) Azitromicina 1g via oral dose única
- (C) Penicilina 2.400.000 UI IM dose única + Azitromicina 500mg via oral dose única
- (D) Ceftriaxone 500mg via intramuscular dose única + Azitromicina 1g via oral dose única
- (E) Doxiciclina 100mg via oral 2x aod dia por 7 dias

QUESTÃO 15

Você está de plantão como médico no SAMU e é chamado para atendimento em via pública. No local, jovem, vítima de atropelamento, masculino, de 23 anos com múltiplas escoriações, taquicárdico (110 bpm), hipotenso (90x60mmHg), Glasgow 13, e abdome tenso a palpação. Considerando que o via já foi interditada e você se encontra em ambiente seguro, qual a primeira medida a ser tomada?

- (A) Acesso venoso periférico
- (B) Acesso venoso central
- (C) Laparotomia exploradora de urgência
- (D) Assegurar via aérea prévia
- (E) Iniciar imediatamente compressões cardíacas

QUESTÃO 16

Um paciente de 35 anos refere diarreia mucosanguinolenta há 12 meses, com emagrecimento de 3 quilogramas nesse período. Há duas semanas apresentou prurido generalizado e há 7 dias icterícia. Nega história familiar de neoplasia. Ao toque retal não se observam massas e na retossigmoidoscopia nota-se presença de intensa hiperemia de toda a mucosa avaliada, com ulcerações frequentes. O diagnóstico mais provável é:

- (A) Neoplasia retal com metástase hepática
- (B) Colite amebiana com abscesso hepático
- (C) Retocolite ulcerativa com colangite esclerosante
- (D) Colite pseudomembranosa e hepatite reacional
- (E) Doença de Crohn e coledocolitase

QUESTÃO 17

As fistulas anais ocorrem, na maioria dos casos, em consequência de:

- (A) Fissura
- (B) Tuberculose
- (C) Traumatismo
- (D) Doença de Crohn
- (E) Abscesso

QUESTÃO 18

A profundidade do câncer gástrico nas camadas da parede é mais facilmente definida pelo seguinte método:

- (A) Ecoendoscopia
- (B) Ressonância magnética
- (C) Endoscopia digestiva alta
- (D) Tomografia computadorizada
- (E) Ultra-sonografia color doppler

QUESTÃO 19

A síndrome de Zollinger-Ellison relaciona-se a:

- (A) Glaucoma
- (B) Gastrinoma
- (C) Somatostinoma
- (D) Carcinóide
- (E) Lipoma

QUESTÃO 20

Homem, 23 anos, com queimadura de 3º grau em toda a extensão anterior do tronco e MMII há uma hora. A perda hídrica nessa fase se caracteriza por:

- (A) Aumento da permeabilidade vascular
- (B) Aumento da pressão coloidosmótica
- (C) Aumento da pressão hidrostática
- (D) Diminuição dos hormônios catabólitos
- (E) Inibição do sistema renina-angiotensina

QUESTÃO 21

Qual o sinal otoscópico mais importante no diagnóstico da Otite Média Aguda?

- (A) Hiperemia da membrana timpânica
- (B) Perda de translucidez da membrana timpânica
- (C) Abaulamento da membrana timpânica
- (D) Perfuração da membrana timpânica
- (E) Opacidade da membrana timpânica

QUESTÃO 22

Lactente de cinco meses, em aleitamento materno exclusivo, deu entrada no serviço de pronto-atendimento com quadro de lesões papuloeritematosas difusas pelo corpo e edema periorbitário e labial. A mãe relata que esse quadro se iniciou cerca de dez minutos após oferecer leite de vaca à criança. Exame físico: ativa, hidratada, boa perfusão capilar, placas papuloeritematosas difusas, pálpebras, orelhas e lábios edemaciados, dispneia leve com sibilância, bulhas rítmicas e normofonéticas, abdome sem alterações.

Neste caso, indica-se:

- (A) Corticoide IV
- (B) Adrenalina IM
- (C) Lavagem gástrica
- (D) Carvão ativado VO
- (E) Anti-histamínico VO

QUESTÃO 23

Escolar de oito anos é levado a consulta de emergência devido a quadro de febre alta (39-39,5°C) e dor de garganta há quatro dias. Os pais informam que o paciente vem recebendo azitromicina há 48 horas sem melhora. Exame físico: exsudato purulento sobre as amígdalas, hiperemia de pilar anterior, petéquias em palato, linfadenomegalia generalizada e ponta de baço palpável. A principal hipótese diagnóstica e a conduta indicada nesse momento são, respectivamente:

- (A) Mononucleose infecciosa – suspender azitromicina
- (B) Difteria - iniciar soro antidiftérico e manter azitromicina
- (C) Amigdalite estreptocócica - manter azitromicina e reavaliar em 48 horas
- (D) Difteria - iniciar soro antidiftérico e substituir azitromicina por eritromicina
- (E) Amigdalite estreptocócica – suspender azitromicina e aplicar dose única de penicilina benzatina

QUESTÃO 24

Pré-escolar de quatro anos é levado a serviço de emergência com quadro, de início há algumas horas, de dificuldade respiratória intensa, febre alta (40°C), toxemia, dor de garganta, sialorréia e estridor. Dada a gravidade do quadro, o paciente é imediatamente transferido para a unidade de cuidados intensivos.

Neste local, a conduta imediata, indicada prioritariamente sobre todas as demais, consiste em:

- (A) Obtenção de radiografia a anteroposterior de tórax no leito
- (B) Coleta de amostra de sangue arterial para avaliação gasométrica
- (C) Administração de antibiótico de largo espectro por via intravenosa
- (D) Expansão de volume com ringer lactato através de acesso periférico
- (E) Realização de intubação traqueal para garantir via aérea permeável

QUESTÃO 25

Pré-escolar de três anos apresenta febre por cinco dias, acompanhada de fraqueza, mal-estar, dor de garganta, lacrimejamento, eritema das conjuntivas e linfadenopatia cervical e pré-auricular. O provável agente etiológico desse quadro clínico é:

- (A) Vírus herpes simples tipo 1
- (B) Streptococcus pyogenes
- (C) Vírus de Epstein-Barr
- (D) Adenovírus do tipo 3
- (E) Bartonella henselae

QUESTÃO 26

Escolar de oito anos, sexo masculino, sofreu acidente enquanto andava de bicicleta. Ao ser atendido na via pública, relatava dor no ombro esquerdo e respondia às solicitações dos paramédicos. Na admissão no setor de emergência, já apresentava quadro clínico de choque. A etiologia mais provável é a ruptura de:

- (A) Baço
- (B) Fígado
- (C) Pâncreas
- (D) Aorta descendente
- (E) Diafragma esquerdo

QUESTÃO 27

Entre os itens a seguir relacionados, assinale a forma de apresentação clínica de alergia ao leite de vaca que não é mediada por IgE:

- (A) Asma
- (B) Rinite alérgica
- (C) Síndrome de alergia oral
- (D) Proctite alérgica
- (E) Anafilaxia

QUESTÃO 28

No exame do quadril do recém nascido, é muito importante a realização do teste de:

- (A) Dick
- (B) Adams
- (C) Denver
- (D) Thomas
- (E) Barlow

QUESTÃO 29

Gestante de 35 anos de idade, sem comorbidades, em indução de parto por pós-datismo. Levada à cesariana de urgência por sofrimento fetal agudo. RN nasce coberto de mecônio espesso, hipotônico, cianótico, em apneia, com FC 74 bpm. Levado à mesa de reanimação, feitos primeiros passos e iniciada a VPP sem resposta; a decisão foi aspirar traqueia sob visualização direta, com grande quantidade de mecônio. Mantida VPP com aumento da FIO2 para 40% e posteriormente para 50%, com melhora do tônus, aumento da FC para 110 bpm e choro fraco. Evoluiu com desconforto respiratório com gemência, taquidispneia e batimentos de aletas nasais, sendo encaminhado para a UTIN pela provável necessidade de assistência ventilatória. O RN mantém desconforto respiratório moderado a grave e é colocado em CPAP nasal, com melhora da cor e da saturação. O RX de tórax evidencia hiperexpansão pulmonar e condensações grosseiras múltiplas em ambos os hemitóraces. Pergunta-se: qual a provável causa do desconforto respiratório deste RN, considerando-se as condições de nascimento e sua evolução?

- (A) Cardiopatia Congênita Cianótica
- (B) Pneumonia Congênita
- (C) Síndrome de Aspiração de Mecônio
- (D) Taquipneia Transitória do RN
- (E) Síndrome do Desconforto Respiratório do RN

QUESTÃO 30

Você recebe na UTI Neonatal um RN com 30 minutos de vida, nascido de um parto cesariana de urgência por descolamento prematuro de placenta. É um RN com idade gestacional avaliada em 38 semanas, com peso de nascimento 3200 g, que nasceu hipotônico, apneico, flácido, sem reflexos e com FC < 60 bpm. Foi reanimado até ventilação com pressão positiva prolongada, com melhora da FC, mas permanecendo hipotônico e com respiração irregular. O escore de Apgar foi de 1/2/4 e 7, respectivamente no 1º, 5º, 10º e 15º minuto de vida respectivamente. Imediatamente ao dar entrada na UTI Neonatal, o recém-nascido evoluiu com movimentos repetitivos em bicicleta de membros inferiores. Que intervenção terapêutica de eficácia comprovada à luz dos conhecimentos atuais pode melhorar o prognóstico neurológico deste recém-nascido?

- (A) Fenobarbital para tratamento das crises convulsivas
- (B) Melatonina
- (C) Sulfato de Magnésio
- (D) Eritropoietina
- (E) Hipotermia Terapêutica

QUESTÃO 31

Em um laudo de mamografia, a classificação BI-RADS significa:

- (A) 1 – exame altamente suspeito
- (B) 2 – achado comprovadamente maligno
- (C) 0 – inconclusivo
- (D) 3 – repetir mamografia a cada 2 anos
- (E) 6 – exame normal

QUESTÃO 32

O exame preventivo de câncer de colo de útero de ser realizado:

- (A) Em todas as mulheres a partir de 18 anos
- (B) Após o início de atividade sexual, em qualquer idade
- (C) Anualmente
- (D) Em mulheres após os 25 anos de idade que já iniciaram atividade sexual
- (E) Em associação com a ultrassonografia transvaginal

QUESTÃO 33

Para o tratamento efetivo de DSTs é necessário o tratamento do parceiro sexual nos seguintes casos, EXCETO:

- (A) Tricomoníase
- (B) Sífilis
- (C) Gonorreia
- (D) Clamídia
- (E) Candidíase vaginal

QUESTÃO 34

O agente etiológico do linfogranuloma venéreo é:

- (A) Chlamydia trachomatis
- (B) Giardialambliia
- (C) *Neisseria gonorrhoeae*
- (D) *Corynebacterium diphtheriae*
- (E) *Calymmatobacterium granulomatis*

QUESTÃO 35

Assinale a alternativa CORRETA com o tratamento específico de cada doença.

- (A) Verruga genital – penciclovir
- (B) Donovanose - ivermectina
- (C) Herpes – aciclovir
- (D) Sífilis – azitromicina dose única
- (E) Candidíase – anfotericina

QUESTÃO 36

Sobre a história fisiológica obstétrica de uma paciente, assinale a INCORRETA:

- (A) G3P1cA1 – significa que a mesma teve um aborto
- (B) G1P1nA0 – significa que a mesma teve um parto normal
- (C) G1P0A0 – significa que a paciente está grávida
- (D) G2P1n1cA0 – significa que a mesma teve uma gravidez de gêmeos com um parto normal e outro por cesariana
- (E) G0P0A0 – é uma multípara

QUESTÃO 37

São vacinas permitidas durante a gestação, EXCETO:

- (A) Difteria, tétano e coqueluche
- (B) Hepatite B
- (C) Influenza
- (D) Febre amarela
- (E) Varicela

QUESTÃO 38

São indicações absolutas de parto cirúrgico, EXCETO:

- (A) Herpes genital ativo
- (B) Feto pélvico
- (C) Condiloma acuminado obstruindo o canal de parto
- (D) Desproporção céfalo-pélvica
- (E) Descolamento de placenta com sofrimento fetal

QUESTÃO 39

São complicações que podem ocorrer no período da amamentação, EXCETO:

- (A) Mastite
- (B) Celulite
- (C) Ingurgitamento e mastalgia
- (D) Mamilo invertido
- (E) Fissuras

QUESTÃO 40

Qual a data provável do parto de uma gestante com a DUM no dia 10/04/2019?

- (A) 18/02/2020
- (B) 17/01/2019
- (C) 16/01/2020
- (D) 10/01/2020
- (E) Nenhuma das alternativas acima.

QUESTÃO 41

Sobre a sífilis, assinale a afirmativa CORRETA.

- (A) O tratamento da sífilis primária é expectante
- (B) O tratamento da sífilis secundária é com Penicilina G Benzatina na dose de 1 200 000 UI em dose única
- (C) O tratamento da sífilis secundária é com Penicilina G Benzatina na dose de 2 400 000 UI em dose única
- (D) O tratamento da sífilis terciária é com Penicilina G Benzatina na dose de 1 200 000 UI, semanalmente, por 3 semanas
- (E) O tratamento da sífilis primária é com Penicilina G Benzatina na dose de 2 400 000 UI em dose única

QUESTÃO 42

O uso de EPIs é obrigatório para todos os profissionais de saúde, considerando isto, é necessária precaução com máscara N-95 na seguinte situação:

- (A) Hanseníase
- (B) Coronavírus
- (C) Meningite
- (D) Tuberculose renal
- (E) Paracoccidiodomicose

QUESTÃO 43

Assinale a alternativa INCORRETA:

- (A) A incidência é o número de casos novos de uma determinada doença
- (B) A prevalência é o número de pessoas com uma determinada doença
- (C) Uma doença que não tem cura, mas que tem tratamento, aumenta a prevalência
- (D) É opcional o preenchimento da declaração de nascidos vivos se o parto foi realizado sem intercorrências
- (E) A declaração de óbito é preenchida em 3 vias

QUESTÃO 44

Sobre uma situação de violência sexual existe profilaxia para as seguintes situações, EXCETO:

- (A) Sífilis
- (B) Gravidez
- (C) HIV
- (D) Hepatite C
- (E) Gonorreia

QUESTÃO 45

Sobre os conceitos de prevenção primária e de promoção da saúde, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Alimentação adequada é uma forma de promoção de saúde
- (B) O uso de preservativo em relações sexuais é uma forma de prevenção quaternária
- (C) O uso de AAS em um paciente que teve um infarto agudo do miocárdio é uma prevenção primária
- (D) Prática de atividade física regular é uma forma de prevenção terciária
- (E) O uso de estatinas é recomendado para todos como forma de prevenção primária

QUESTÃO 46

A hanseníase é uma doença que ainda causa incapacidades permanentes funcionais em indivíduos. Sobre esta doença assinale a alternativa CORRETA.

- (A) É uma doença infecto contagiosa, com alta transmissibilidade entre seres humanos, mesmo com pequenos períodos de contato
- (B) Tem acometimento da pele e dos nervos, havendo perda de sensibilidade em manchas
- (C) O tratamento está disponível em toda a rede pública e em qualquer farmácia podendo ser comprado todos os medicamentos sem receita
- (D) Na forma multi-bacilar o tratamento é de 6 meses
- (E) A forma pauci-bacilar tem baciloscopia positiva

QUESTÃO 47

A dengue no Brasil ainda é um problema de saúde pública, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O tratamento específico está disponível na rede pública através das farmácias de alto custo
- (B) O tratamento engloba medicamentos sintomáticos e hidratação
- (C) Todos os casos devem ser tratados em unidades de internação hospitalar
- (D) Plaquetopenia é um achado laboratorial raro
- (E) Sintomas hemorrágicos e dor abdominal não classificam a dengue como grave

QUESTÃO 48

É doença de notificação compulsória imediata:

- (A) Hanseníase
- (B) HIV
- (C) Raiva
- (D) Leishmaniose tegumentar
- (E) Sífilis

QUESTÃO 49

Sobre a profilaxia antirrábica, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) Está indicada 4 doses de vacina nos casos em que o animal agressor é observável
- (B) Quando a mordedura ocorreu em extremidades é considerado grave
- (C) No caso de um segundo acidente por mordedura animal, sendo o primeiro há 4 anos e tendo realizado todas as doses de vacina na ocasião, não é necessária nova dose de vacina
- (D) A imunoglobulina é feita via endovenosa
- (E) Após o soro antirrábico é necessário deixar o paciente de observação por 2 horas

QUESTÃO 50

Sobre a ética médica, assinale a alternativa CORRETA.

- (A) O paciente consciente e orientado não tem o direito de escolher entre duas opções terapêuticas quando uma pode trazer resultados inferiores.
- (B) O sigilo não precisa ser mantido após a morte.
- (C) Um paciente com HIV pede sigilo, evolui para óbito após 7 dias, mesmo com o pedido de sigilo, o HIV deve constar na declaração de óbito.
- (D) O médico deve respeitar a vontade do paciente, mesmo em situação de risco iminente de morte.
- (E) É necessário boletim de ocorrência para o atendimento de vítimas de violência sexual.